

Dermatose nodulaire contagieuse


Espèces touchées



Clinique/Pathologie

-  Fièvre (jusqu'à 41°C et plus)
-  Diminution de la production
-  Abattement, baisse d'appétit
-  Ecoulement nasal et/ou buccal
-  Nodules cutanées (signes tardifs)

- Période d'incubation : 28 jours
- Sans danger pour l'être humain



© Friedrich-Loeffler-Institut



© Friedrich-Loeffler-Institut



© Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (France)

Prévention



Lutter contre les insectes piqueurs

→ répulsifs, insecticides, réduction des zones de reproduction



Renforcer la biosécurité

→ matériel propre, visiteurs limités, hygiène



Surveiller les animaux quotidiennement

→ fièvre, nodules, baisse de production




Annoncer immédiatement tout cas suspect

→ vétérinaire traitant

Epidémiologie

Principaux vecteurs du virus / transmission



Mouches piqueuses



Taons

Transmission indirecte

- Vecteurs biologiques : mouches piqueuses, taons
- Aliments, eau, outils, personnes

Transmission directe

- Par contact direct entre les animaux infectés

→ Morbidité : 5-45%

→ Mortalité : 1-5%

Contact

Direction des affaires vétérinaires et de l'inspection



021 316 38 70



info.svet@vd.ch



<https://www.vd.ch>

En savoir plus

